



Le Vautour fauve et le Gypaète barbu en Haute-Savoie

Questions et réponses

Juillet 2012

La présence de nombreux Vautours fauves, depuis l'été 2007, sur la Haute-Savoie soulève de nombreuses questions. Même si depuis déjà quelques années les ornithologues observaient régulièrement le vautour fauve en été sur le département, l'oiseau n'est pas passé inaperçu avec des effectifs allant jusqu'à une soixantaine d'individus !

Mal connu du public et des acteurs de la montagne (et pour cause, il était discret !), il nous a semblé utile de donner différentes informations pour mieux connaître le Vautour fauve. Nous en profitons pour présenter, à nouveau, le Gypaète barbu, plus connu des Hauts-Savoyards puisque revenu dans nos montagnes depuis plus de 20 ans !

Bonne lecture.

LPO Haute-Savoie - Asters

QU'EST-CE QU'UN VAUTOUR ? COMMENT ET OÙ VIT-IL ?

Il existe **4 espèces de vautours en Europe méridionale** : le Vautour fauve, le Vautour moine, le Percnoptère d'Égypte et le Gypaète barbu. Ce sont des oiseaux rapaces diurnes. Ils fréquentent les montagnes de l'Ancien Monde. Ces espèces sont spécialisées dans la consommation de carcasses d'ongulés sauvages ou domestiques, morts par accident, de maladie, de famine, ou tués par un prédateur. Ils ont des stratégies de recherche de nourriture et de reproduction différentes qui leur permettent d'exploiter des ressources identiques sans qu'il y ait de concurrence entre eux. Deux des quatre espèces sont visibles fréquemment, en Haute-Savoie :



Le Vautour fauve

Entre 2.40 et 2.70 mètres d'envergure, 9 kg en moyenne. Long cou et tête dénudés, collerette blanche chez l'adulte, brune chez le jeune, plumage brun gris. Premier sur une carcasse, spécialisé dans la consommation de chair molle.

Vit en colonie, associé aux milieux rupestres, au pastoralisme et aux zones aérologiques permettant le vol à voile. Reproduction sur 8 mois de l'année, à partir de 5 ou 6 ans. Donne 1 seul jeune (en moyenne 1 jeune tous les 2 ans).

Le Gypaète barbu

Entre 2.50 et 2.80 mètres d'envergure, 7kg en moyenne. Tête emplumée, cercle orbital rouge, barbichette autour du bec. Plumage ardoise chez l'adulte, tête et poitrail rouge orangé, suite à une coloration dans de la boue ferrugineuse. Spécialisé dans la consommation d'os. Vit en couple, associé aux falaises et aux montagnes. Reproduction pendant 10 mois de l'année, à partir de 7 ou 8 ans. Donne 1 seul jeune (en moyenne 1 jeune tous les 3 ans).



QUELLE EST L'UTILITE ECOLOGIQUE D'UN VAUTOUR ?

Les vautours jouent le **rôle d'agents sanitaires**. Ce sont les « **éboueurs de la nature** ». En faisant disparaître rapidement les carcasses, ils empêchent le développement d'épidémies, cassent le cycle de certains parasites et contribuent à limiter les risques de pollution des sources d'eau.

COMBIEN Y A-T-IL DE VAUTOURS EN FRANCE ET EN HAUTE-SAVOIE ? OU SE REPRODUISENT-ILS ?


Vautour fauve :

Réparti dans les Pyrénées, les Causses, et les Préalpes du sud. A noter que 90% des effectifs européens vivent en Espagne (environ 20 000 couples).

En France, la répartition est la suivante :

- 230 à 240 couples dans les Causses
- 100 à 110 dans les Baronnies
- 10 à 15 dans le Diois
- 30 à 40 dans le Verdon
- 700 à 800 couples dans les Pyrénées françaises

En Haute-Savoie, le Vautour fauve est observé tous les ans pendant la période d'estive depuis 2001. Il ne s'y reproduit pas.




Gypaète barbu :

Réparti sur tout l'arc alpin, dans les Pyrénées, en Corse

- 20 couples reproducteurs dans les Alpes, deux noyaux principaux de population : dans les Alpes nord occidentales (Savoie, Haute-Savoie, Valais) et dans les Alpes centrales.
- Une centaine de couples dans les Pyrénées dont une trentaine côté français
- 5/10 couples en Corse

En Haute-Savoie, 3 couples se reproduisent dans les massifs du Bargy, des Aravis et d'Arve-Giffre.



Ancienne aire de répartition du Gypaète barbu au XIXème siècle

Répartition actuelle : population n'ayant jamais disparu – population ayant disparu au début du XXème siècle puis réintroduite à partir de 1986.

EST-CE QUE LES VAUTOURS ONT ETE REINTRODUITS EN HAUTE-SAVOIE ?

Vautour fauve : NON

Le Vautour fauve n'a pas été réintroduit en Haute-Savoie mais dans les Cévennes et dans les Préalpes du sud sur 5 sites : Causses, Navacelles, Baronnies, Verdon, Vercors. Environ 300 vautours réintroduits entre 1981 et 2004.

Gypaète barbu : OUI

Le Gypaète barbu a été réintroduit en Haute-Savoie et dans 3 autres sites de l'arc alpin. Au total 189 oiseaux ont été réintroduits depuis 1986 dont 35 pour la Haute-Savoie entre 1987 et 2005.


La méconnaissance profonde des vautours et de leurs modes de vie ainsi qu'un attachement excessif aux mythes et fables avaient conduit à leur disparition dans les Alpes et dans les Cévennes, au début du XX^{ème} siècle, contrairement aux Pyrénées où il en est resté quelques noyaux. A ces persécutions par l'Homme se sont ajoutés la modification des modes de pastoralisme, l'usage d'appâts empoisonnés ou de contaminants ainsi que la convoitise de collectionneurs de musées et de zoos.

D'OU VIENNENT LES VAUTOURS QUI SONT OBSERVES EN HAUTE-SAVOIE ?

Les vautours sont de grande taille (jusqu'à trois mètres d'envergure), pèsent plusieurs kilos, et sont ainsi capables de se déplacer sur de grandes distances en utilisant le vol plané, explorant ainsi avec de faibles dépenses d'énergie de vastes surfaces à la recherche de leur nourriture.

Le Vautour fauve effectue des déplacements entre les colonies et les jeunes sont capables d'effectuer des déplacements estivaux (entre mai et octobre). **Ces mouvements ont toujours existé, et sont réapparus avec le retour des colonies caussenardes et**

sud-alpines depuis 1990. Actuellement, des mouvements de vautours sont constatés en France, en Belgique, aux Pays-Bas... Ils ne sont exceptionnels que par le nombre d'individus concernés. **Ces jeunes vautours, également observés en Haute-Savoie proviennent des populations pyrénéennes (françaises et espagnoles), caussenardes et sud-alpines.**



Le Gypaète barbu est lui aussi capable d'effectuer des déplacements à grandes distances dans les quatre premières années de sa vie sur tout l'arc alpin, visitant les massifs à la recherche de nourriture et d'un territoire quand il sera en âge de se reproduire, pas avant l'âge de 7 ou 8 ans. **Les Gypaètes barbues observés en Haute-Savoie sont soit les individus adultes des couples qui s'y reproduisent, soit de jeunes individus en erratisme.**

PEUT-IL Y AVOIR TROP DE VAUTOURS ?

Placés en fin de chaîne alimentaire, les vautours sont dépendants de la ressource en nourriture qu'ils vont trouver dans la nature, ce qui conduit à réguler naturellement les populations.

Des observations d'une soixantaine d'individus de Vautours fauves sont normales, cette espèce vivant en colonie.

EST-CE QUE LES VAUTOURS SONT DES ESPECES PROTEGEES ?

Ces espèces sont strictement protégées à l'échelle nationale et européenne (Directive Oiseaux). Il est donc interdit de les détruire, capturer, déranger, transporter et naturaliser (cf arrêté 17 avril 1981).

EST-CE QUE LES VAUTOURS SONT DANGEREUX POUR L'HOMME ET LES TROUPEAUX ?

Les vautours ne sont pas des prédateurs. Ils sont **uniquement des charognards de part leur « équipement »**. Les vautours ont perdu leurs armes de rapaces prédateurs : les

serres. Le bec crochu, impressionnant, n'est pas une arme pour tuer mais un outil très efficace pour dépecer les cadavres. Les pattes du Gypaète barbu sont restées préhensiles car il les utilise pour transporter les os qu'il lâche ensuite sur les rochers pour les briser et les consommer.

Les Vautours sont capables de repérer une carcasse à plusieurs kilomètres, grâce à leur vue perçante, et leur capacité de déplacement leur permettra d'arriver rapidement sur les lieux. Les Vautours fauves, en se dispersant pour rechercher leur nourriture, augmentent leur chance de trouver une carcasse. Quand un individu a repéré un cadavre, il va attirer ses congénères par un vol particulier.

Il n'y a donc aucun danger pour l'homme ou pour les troupeaux.

LES VAUTOURS PEUVENT-ILS S'ATTAQUER AUX TROUPEAUX ?

Même si les vautours ne sont pas adaptés pour la prédation, il ne faut pas nier la potentialité d'attaques **dans des conditions précises et dans des cas très rares**. Le Vautour fauve est un opportuniste et sait distinguer les faiblesses au sein de certains troupeaux, surtout quand celles-ci sont récurrentes et liées à une **pratique de l'élevage non adaptée**. Selon l'expérience qui a été menée dans les Grands Causses, où des constats sur les troupeaux, réalisés par des agents assermentés de l'Etat et des experts vétérinaires, sont menés en cas de présence de vautours fauve perçue comme agressive à l'égard du bétail, 95% des expertises sur du bétail mort ont exclu le Vautour fauve dans les causes de la mort. Dans 5% des cas, l'intervention du Vautour fauve s'est toujours portée sur des bêtes qui étaient condamnées. **Une bête en bonne santé n'a donc rien à craindre du Vautour fauve.**

QUE FAIRE EN CAS D'ATTAQUE DU TROUPEAU PAR DES GRANDS CARNIVORES

En cas d'attaque du troupeau par un grand carnivore (chien, loup, lynx), il est recommandé aux éleveurs, dans la mesure du possible, de couvrir les bêtes les plus caractéristiques avec une bâche tenue par des pierres, afin de permettre aux agents habilités à cet effet de réaliser le constat de dommages.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

- Le Gypaète barbu de Jean-François Terrasse, Les Sentiers du Naturaliste, Edition Delachaux et Niestlé, 2001
- Le Vautour Fauve de Bertrand Eliotout, Les Sentiers du Naturaliste, Edition Delachaux et Niestlé, 2007
- Evolution des mouvements de vautours en Europe, Michel Terrasse, Ornithos, 2006
- www.vautours.lpo.fr
- <http://haute-savoie.lpo.fr>
- www.gypaete-barbu.com

CONTACTS :

- **Pour le Vautour fauve**
Ligue pour la Protection des Oiseaux Haute-Savoie
Xavier Birot-Colomb ou David Rey
04 50 27 17 74
haute-savoie@lpo.fr
<http://haute-savoie.lpo.fr>



- **Pour le Gypaète barbu**
Asters, Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie,
Marie Zimmermann
04 50 93 08 48
gypaete@asters.asso.fr
www.gypaete-barbu.com



Toutes vos observations de vautours sont importantes. N'hésitez pas à nous les transmettre.



Vautour moine



Vautour fauve



Gypaète barbu



Percnoptère d'Égypte

Légende des dessins : Alexis Nouailhat

Légende des cartes : Le Gypaète barbu de Jean-François Terrasse, Les Sentiers du Naturaliste, Edition Delachaux et Niestlé et Le Vautour Fauve de Bertrand Eliotout, Les Sentiers du Naturaliste, Edition Delachaux et Niestlé